

**术前说明**

**术后说明**

## 角膜移植 (FLAAK) : 术前说明

亲爱的患者,

您将接受屈光手术。术前说明可让您为干预当天做好充分准备, 从而促进干预的顺利进行。因此, 我们感谢您遵守以下说明, 准时赴约:

- 如果您的眼科医生没有推荐, 请不要中断常用的药物
- 不要空腹来, 手术前做便餐, 避免兴奋剂(咖啡, 烟草等)和干预前饮酒, 以确保您的返回。
- 手术前 8 天: 不要化妆, 去除睫状体延伸。避免灰尘的地方(地窖, 阁楼等), 动物, 骑马, 游泳池
- 避免香水, 酒精烟雾可能导致准分子激光 紊乱。
- 手术当天不要佩戴珠宝。
- 不要在头发上戴杆。
- 避免面包。
- 有干净的头发。
- 留着干净的胡须。
- 抵达时请关闭手机, 然后将其放在衣帽间, 该衣帽间将向您显示。
- 不要嚼口香糖。

**如果您是隐形眼镜佩戴者, 请在 8 天前取下隐形眼镜**

**N.B :** 如果这些不同的指示没有得到严格遵守, 诊所保留推迟干预的权利。

## 角膜异位 (FLAAK) : 术后说明

亲爱的患者,

您刚刚从 **Keratopigmentation** 中受益。为了您的视觉健康和舒适度, 我们为您提供以下建议:  用太阳镜保护眼睛 (眩光的感觉是正常的)。

- 避免尘土飞扬的地方, 动物, 骑马
- 在前 15 天不要揉眼睛。
- 还要避免在穷人身上产生任何摩擦。
- 15 天内不要化妆。
- 要清洁眼睛, 请用湿敷轻轻擦拭。
- 在第一周, 不要把头放在海上或游泳池的水下。
- 第一周在淋浴时闭上眼睛, 避免肥皂。
- 避免在第一周流汗进入眼睛。
- 避免危险的体育活动 15 天。(戴头带出汗)
- 尊重术后治疗中规定的不同滴眼液的剂量。
- 将不同的眼药水滴入几秒钟。注意不要

用滴眼液的尖端触摸角膜。如有必要, 请寻求帮助以放置滴剂。

### 术后随访/建议 :

在手术后的最初几个小时内, 您可能会感到与刺痛相关的轻度疼痛。

不受控制的流泪是很正常的, 沉重的眼睑会自行闭合。眼睛里有沙粒的感觉是正常的, 随着人工泪液的滴注而减弱。建议在前 48 小时内每半小时滴一次眼泪。

如果您感到轻微的疼痛, 建议您在手术后几个小时尝试入睡。

手术后的第二天, 您的视力必须恢复。在最轻微的针灸下降或异常疼痛时, 您必须立即去看眼科医生, 或者在缺席的情况下去医院。